

Delegering (080618 Dr Mikael Jaszczak)

avseende läkemedelstillförel till personer som är boende i något av **Älvsbyns kommuns särskilda boenden**.

Observera att delegering innebär en rättighet - men ingen skyldighet - att i vissa fall tillföra ej ordinerat läkemedel utan föregående läkarkontakt.

Delegeringen gäller endast vid

1. stor brådska eller

2. vid enklare frågeställningar dvs antingen

■ då läkemedelstillförel bör ske omedelbart och tid inte finns att hinna kontakta jourhavande läkare eller invänta ambulansens ankomst eller

■ då patientens tillstånd är sådant att kontakt med jourhavande läkare inte bedöms nödvändig

Samtliga angivna preparat kan vid behov ges ytterligare en gång dock bör om möjligt läkare kontaktas före detta sker.

Allmänt gäller att **vid tveksamhet skall jourhavande läkare kontaktas före eller efter läkemedelstillförel**.

Observeras bör att delegeringen gäller **endast** för angivna indikationer.

Vad gäller dosering gäller **FASS i första hand** och det som eventuellt står i listan är att betrakta som kommentar och förtydligande till FASS-texten.

Preparat	Styrka	Indikationer	Kontra-indikationer	Dosering	Observera/kommentar
Inj Adrenalin	1 mg/ml s c 0,1 mg/ml iv	Anafylaktisk reaktion Spädes 1:10 vid i v tillförel		0,3-0,5 mg sc/ iv Upprepas vb	Tillståndet är allvarligare ju snabbare det fortskrider - Adrenaltillförel tidigt är viktigaste åtgärden
Spray Nitrolingual	0,4 mg/dos	Hjärtmisstänkta bröstsmärtor. Lungödem.		1-2 sprayningar Upprepas v b	På munslemhinnan - helst under eller på tungan
Inj Morfin	10 mg/ml	Hjärtmisstänkta bröstsmärtor som inte släpper på Nitro. Lungödem.		0,5-1ml iv/sc Upprepas v b	
Drp Haldol	2 ml/ml	Illamående och kräkning.		1-3 droppar v b	En droppe = 0,1 mg
Inj Haldol	5mg/ml	Illamående och kräkning.		0,1-0,2 ml im/iv	
Supp Primperan	20 mg	Illamående och kräkning.		1 supp	
Inj Furosemid	10 mg/ml	Inkompensation och lungöden		2-4 ml iv/im	iv tillförel är bäst.
Inj Glukagon - Hypokit	1 mg	Hypoglykemi		1 mg iv/sc/im	
Inj Glukos	300 mg/ml	Hypoglykemi med oförmåga att äta och dricka		50-100 ml iv	Ger vävnadsskador vid extravasal injektion
Klysmas Stesolid	10 mg	Kramper		1 klysmas	
T/Supp Panodil		Värk, smärta och feber.		0,5-1 g	
Voltaren supp	50 mg	Smärta		1 supp	
Zopiklon tabl	5 mg	Sömnproblem		1 v b	Vid ofta förekommande behov alltid kons med PAL.
T Dimor	2 mg	Diarré	Inflammation i tarmen Förstoppningsdiarré	2 tabletter	Efter 2-3 timmar vid behov ytterligare 1 tablett
Klysmas Klyx	120 ml	Förstoppning		1 klysmas	
Dr Laxoberal	7,5 mg/ml	Förstoppning	Akut buk, tarmstopp, uttorkning	5-20 droppar	
T Oxascand	5 mg	Oro		1-2 tabletter	
T Cetirizin	10 mg	Allergiska besvär och klåda		1-2/dag	
T Acetylcystein	200 mg	Segt slem i bronkerna		1 v b	
Ögonsalva Fucithalmic		Variga ögon	Säker diagnos?	1 drp x 2	